

Circuncisión

Instrucciones para después de darse de alta

Para más información

- Urología
206-987-2509
- Consulte con el médico de su niño o a la enfermera
- www.seattlechildrens.org

Servicio gratuito de interpretación

- Estando en el hospital, solicítelo con la enfermera de su niño.
- Fuera del hospital, llame a nuestra línea gratis de interpretación 1-866-583-1527. Mencíonele al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.
- Para personas sordas y con problemas de audición marque el: 206-987-2280 (TTY)

La circuncisión es una operación en la que se extirpa el prepucio dejando al descubierto la cabeza del pene.

¿Qué cuidados son necesarios después de la cirugía?

El área de la incisión estará roja e hinchada y volverá a la normalidad en pocas semanas.

- Aplique durante 12 días la pomada con antibiótico (Neosporin, Polysporin, Bacitracin, etc.) en la punta del pene y alrededor del anillo PlastiBell (si es que se ha usado) en cada cambio de pañales o cada vez que el niño orine.
- Si sangra, aplique presión con una gasa sobre el pene de manera suave pero constante durante cinco minutos.

¿Cuánta actividad es recomendable?

- Vigile al niño durante el resto del día, la mayoría de los niños vuelven a la normalidad en 24 horas.
- En las primeras 24 horas bañe a su niño con una esponja. Pasado este período puede volver a su rutina anterior.

¿Cómo calmo el dolor?

- Es común que después de la cirugía tenga molestias que van a empezar a mejorar a partir del primer día.
- El Acetaminofeno (Tylenol, Liquiprim, Panadol, etc.) debería ser suficiente para controlar el dolor, úselo de acuerdo a las indicaciones del doctor.

¿Cuándo debe caerse el dispositivo?

Si se ha usado un anillo PlastiBell, se debe desprender después de cinco días. Si ocurre **antes** de cinco días, llámenos para pedir una cita. Si han pasado **más** de 10 días y no se ha desprendido, también llámenos para pedir una cita.

¿Cuándo debo llamar al doctor?

- Si su niño tiene cualquier problema, llame durante el día a nuestra oficina al número: 206-987-2509. Para llamadas después de horario de oficina: 206-987-2000 y pida hablar con urología.
- Llame si su niño presenta:
- Fiebre arriba de 101.5 F (38.6 C)
- Enrojecimiento e inflamación que se extiende hacia la zona del estómago.
- Sangrado que no para después de aplicar presión durante cinco minutos.
- Dolor constante e intenso.

Seattle Children's ofrece servicios gratis de interpretación para pacientes, miembros de la familia y representantes legales sordos, con problemas de audición o con dominio limitado del inglés. Seattle Children's pondrá a disposición esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de recursos para las familias al 206-987-2201.

Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.

© 2008, Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington. Derechos reservados.

5/09
Tr (jw/jf)
PE151S

Circumcision

Discharge instructions for home

To Learn More

- Urology
206-987-2509
- Ask your child's nurse or doctor
- www.seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your child's nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.
- For Deaf and hard of hearing callers
206-987-2280 (TTY)

Circumcision is an operation to remove the foreskin and uncover the head of the penis.

How do I care for the surgery site?

After surgery the incision area will look swollen and red. Within a few weeks, the area will return to normal.

- Apply antibiotic ointment (Neosporin, Polysporin, Bacitracin, etc.) to the tip of the penis and around the PlastiBell ring (if one is used) with each diaper change, or after your child uses the toilet, for 12 days.
- If bleeding occurs, apply constant, gentle pressure with a gauze pad to the penis for five minutes.

How much activity can my child do?

- Watch your child closely today. Most children can go back to normal activity in 24 hours.
- Sponge bathe only for the first 24 hours, then resume regular bathing daily.

What should I give my child for pain?

- Discomfort is common right after surgery but should get better after the first day.
- Acetaminophen (Tylenol, Liquiprim, Panadol, etc.) should provide adequate pain relief. Use as directed by your doctor.

When should the ring fall off?

If a PlastiBell ring is used, it should fall off after five days. If the ring falls off **before** 5 days, call us to schedule an appointment. If the ring does not fall off **after** 10 days, call us to schedule an appointment.

When should I call a doctor?

If your child is having any problems, call our office at 206-987-2509 during the day. After hours call 206-987-2000 and ask the hospital operator for Urology.

Call us if your child has any of these warning signs:

- Fever higher than 101.5° F (38.6° C)
- Redness and swelling that spreads up into the stomach area
- Bleeding that cannot be stopped after five minutes of pressure has been applied
- Severe, constant pain

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201.

This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider.

© 1994, 2003, 2006, 2008, 2009 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.