

Material educativo para el paciente y la familia

CENTRO CRANEOFACIAL

Reparación de labio leporino y nariz: Atención posterior a la cirugía

¿Cómo afectará a mi niño y la familia la cirugía?

Por una o dos semanas posteriores a la cirugía, su niño necesitará atención y comprensión adicional. No se preocupe por “consentir” a su niño durante este tiempo. Está bien responder a la necesidad de su niño que lo abracen y le den confort.

¿Qué debo esperar después de la cirugía?

Después de la cirugía su niño estará soñoliento por varias horas. Los medicamentos y líquidos se le administrarán por vía intravenosa. Tendrá los brazos restringidos con unas mangas largas de tela rígida. Algunos niños tendrán tubos de plástico suave llamados endoprótesis nasales. Estas endoprótesis mantienen la forma de la nariz mientras está sanando. El labio y la nariz estarán hinchados. Posiblemente note un poco de drenaje sanguinolento alrededor de la boca y debajo de la nariz y estarán cubiertos con pomada.

¿Cómo comerá mi niño?

Después de que despierte su niño, le puede dar líquidos transparentes o leche materna con el biberón que usa normalmente. Si lo tolera, bien puede entonces continuar con la fórmula usual. Los bebés que toman leche de pecho pueden tomar la leche materna en biberón o del pecho inmediatamente. La mayoría de los bebés comen bastante bien después de cirugía, pero algunos rehúsan a tomar el biberón o el pecho. Las enfermeras le ayudarán a encontrar la manera de alimentar a su bebé, esto podría incluir el darle medicamento para el dolor antes de los alimentos y posiblemente usar una jeringa o botella exprimible para darle los alimentos hasta que su bebé

esté dispuesto a tomar de su biberón normal o tomar el pecho.

¿Qué tipo de atención médica será necesaria en el hogar?

Restricción de los brazos. Mantenga todo el tiempo los brazos restringidos con las mangas, 24 horas al día por 2 semanas. Es importante mantenerlos restringidos porque el bebé podría dañar el sitio de la cirugía accidentalmente con las manos. Puede dejar de restringir los brazos por un rato corto para bañarlo y ejercitarlo. Durante este rato, asegúrese de detenerle las manos libres.

Alivio para el dolor. Tanto los medicamentos para el dolor como las técnicas para tranquilizar pueden ayudar a su bebé a estar más confortable. Para el hogar, le proporcionarán medicamento oral para el dolor para darle a su niño. Por los primeros días posteriores a la cirugía, es necesario darle el medicamento bajo un horario regular antes de que su niño se queje de dolor. Después de esto, si su bebé está confortable, puede cambiar a Tylenol™ regular conforme lo necesite. La mayoría de medicamentos contra el dolor pueden causar estreñimiento. Si esto es un problema para su bebé, le puede dar de 1 a 2 onzas de jugo de pera hasta que esté más regular. Si el bebé está muy incómodo a causa del estreñimiento, puede usar supositorios de glicerina para bebés. Los supositorios los puede comprar sin receta en cualquier farmacia.

(Continúa al reverso)

Atención médica del labio y nariz. Cada día limpie las incisiones del labio y la nariz de su niño con agua tibia y un poco de jabón neutral. Seque con cuidado. Aplique la pomada antibiótica en las incisiones 3 o 4 veces al día para mantenerlas húmedas y con grasa. Si en las incisiones del labio aparecen “costras”, aflójelas gentilmente con agua tibia y retírelas tan frecuentemente como sea necesario.

Algunos niños tienen puntos que se disuelven por sí solos durante la semana posterior a la cirugía y algunos niños tienen puntos que se deben retirar de 6 a 7 días posteriores a la cirugía. Su cirujano le explicará qué tipo de puntos tiene su niño. Si su niño tiene puntos que es necesario retirarlos, es importante que esto se lleve a cabo exactamente de 6 a 7 días posteriores a la cirugía. Por favor llame para hacer una cita para que se los retiren.

Si su niño tiene endoprótesis (cánula/tubo pequeño de plástico) nasales, trate de evitar que se tapen con mucosidad reseca. La enfermera le indicará cómo poner gotas de agua salina dentro de los tubos para mantener la mucosidad húmeda. Aplique el agua salina dentro de los tubos por lo menos 4 veces al día. Lo puede hacer más frecuentemente si es necesario. Esto no lastimará a su bebé aunque probablemente no le guste. Algunos bebés estornudan después de aplicar el agua salina dentro de la nariz. Esto está bien – los tubos están sujetos por medio de puntos y se mantendrán en su lugar. Algunas veces a pesar de su esfuerzo, los tubos se tapan, mientras un lado esté abierto esto usualmente no es un problema. Por favor llame si ambos lados se tapan o si su bebé tiene problemas para respirar o comer debido a que estén tapados los tubos. Conforme la hinchazón nasal disminuye los tubos podrían verse sueltos pero no es necesario hacer nada. Las endoprótesis nasales se mantienen en su lugar por 2 a 4 semanas, fácilmente se retiran durante una visita a la clínica.

¿Cuándo debo llamar al Centro craneofacial?

Llame si tiene alguna pregunta acerca de la atención médica de su bebé o si su bebé tiene cualquiera de estos signos:

- Fiebre de más de 100.5°F o 38°C
- Aumento en la inflamación o enrojecimiento del labio o supuración de las incisiones
- No come bien
- Los medicamentos no calman el dolor
- Cualquier dificultad con las endoprótesis nasales

¿Cómo me comunico con alguien en el Centro craneofacial?

Si llama entre la 8:00 a.m. y las 4:30 p.m. de lunes a viernes llame al (206) 987-2208, opción 4 o la línea gratis al (866) 987-2000 ext. 2208, opción 4 para hablar con una de las enfermeras.

Si necesita consultar con alguien después de horas hábiles, fin de semana o días festivos por favor llame al operador del hospital Children's al (206) 987-2000 o la línea gratis (866) 987-2000 y solicite hablar con el proveedor de cirugía plástica que esté de turno.

Para asistencia con interpretación telefónica, por favor marque el número gratis 1-866-583-1527.

PARA MAYOR INFORMACIÓN

- Centro Craneofacial (206) 987-2208
- El proveedor de atención médica de su niño

El hospital Children's pondrá a disposición esta información en formatos alternativos si así se solicita. Por favor llame al Centro de recursos para la familia al (206) 987-2201.

Este volante lo revisó el personal clínico del hospital Children's. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención de su niño.