

# Cirugía bucal menor

## ¿Preguntas o problemas?

Si su niño recibió el tratamiento en la sede central del hospital Seattle Children's llame a:

- Clínica dental  
206-987-2243  
De 8 a. m. a 5 p. m. de lunes a viernes
- Departamento de Emergencias de Children's  
206-987-2222  
De 5 p. m. a 8 a. m. de lunes a viernes y fines de semana

Si su tratamiento se hizo en el Centro de Cirugía Dental en Magnuson Park llame al:

- Centro de Cirugía Dental (en el Centro de Odontología Pediátrica)  
206-616-6880  
De 6:30 a. m. a 5 p. m. de lunes a jueves. Deje un mensaje y responderemos a su llamada.
- Fuera del horario de oficina llame al 206-987-2000 y pida hablar con el odontólogo residente de guardia.

## ¿Qué debo saber acerca del sangrado de mi niño?

Una vez que se haya terminado la cirugía bucal de su niño y le den de alta, tendrá gasas en forma de almohadilla en la boca que debe morder. La presión constante ayuda a coagular la sangre. Después de veinte minutos quite las gasas.

El sangrado puede continuar durante todo el día. Si es demasiado, coloque una nueva gasa mojada doblada en forma de almohadilla sobre la herida y haga que su niño la muerda firmemente por veinte minutos. Si su niño continúa sangrando, por favor llámenos.

## ¿Qué instrucciones debo seguir para la medicina del dolor?

Cuando lleguen a su casa, dele a su niño la medicina para el dolor antes de que el efecto de la anestesia haya pasado.

Si su niño tiene malestar estomacal o vomita después de tomar la medicina para el dolor, espere un tiempo antes de darle algo para beber o más medicina. Cuando su niño se sienta mejor, puede tomar líquidos transparentes como 7-Up sin gas y trate de darle la medicina otra vez. Si su niño continúa vomitando, por favor llame a la clínica.

Dele la medicina para el dolor como le fue indicado hasta que su niño se sienta mejor de la herida. Algo de dolor o molestia podrían durar hasta una semana. Si el dolor aumenta después del tercer día, por favor llame.

## ¿Es mala la hinchazón?

No, la hinchazón significa que la herida está cicatrizando. La mayor hinchazón se produce 2 días después de la cirugía. Demorará de 5 a 7 días para que baje. Si continúa aumentando después del tercer día, por favor llame.

## ¿Cómo se usan las compresas de hielo?

La cantidad de hinchazón durante los primeros 3 días dependerá del tamaño de la cirugía. Las compresas de hielo pueden ayudar; colóquelas por afuera de la cara de su niño, déjela por quince minutos y quítela por quince minutos. Repita esta secuencia por el resto del día.

Si la hinchazón aumenta después de tres días, por favor llame.

## ¿Cómo debe mi niño enjuagarse la boca usando agua tibia con sal?

El agua con sal ayuda a mantener la herida aseada y a que se sienta mejor. Su niño debe comenzar a enjuagarse la boca al día siguiente de la cirugía. Mezcle  $\frac{1}{2}$  cucharadita de sal con agua tibia en un vaso grande. Haga que su niño agite de lado a lado el agua con sal dentro de la boca por unos cuantos segundos (de 10 a 15) cada 2 ó 3 horas por el resto del día.

Al día siguiente de la cirugía su niño puede continuar el cepillado de sus dientes como lo hace usualmente, pero trate de evitar que se toque la herida con el cepillo.

### Servicios gratis de interpretación

- Dentro del hospital, solicítelo con la enfermera de su niño.
- Fuera del hospital, llame a nuestra línea gratis de interpretación telefónica 1-866-583-1527. Menciónele al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.
- Para personas sordas y con problemas de audición 206-987-2280 (TTY).

---

Seattle Children's ofrece servicios gratis de interpretación para pacientes, miembros de la familia y representantes legales sordos, con problemas de audición o con dominio limitado del inglés. Seattle Children's pondrá a disposición esta información en formatos alternativos bajo solicitud. Por favor llame al Centro de recursos para las familias al 206-987-2201.

Este volante fue revisado por personal clínico de Seattle Children's. Sin embargo, como las necesidades de su niño son únicas, antes de actuar o depender de esta información, por favor consulte con el proveedor de atención médica de su niño.

© 1994, 2003, 2007, 2009, 2011 Seattle Children's Hospital, Seattle, Washington. Todos los derechos reservados.

3/11  
Tr (mg/jf)  
PE163 S

**Questions or problems?**

If your procedure was at Seattle Children's main hospital campus:

- Dental Clinic  
206-987-2243  
Hours: 8 a.m. - 5 p.m.  
Monday - Friday
- Children's Emergency Room  
206-987-2222  
Hours: 5 p.m. - 8 a.m.  
Monday - Friday;  
and weekends

If your procedure was at the Dental Surgery Center in Magnuson Park:

- Dental Surgery Center (at the Center for Pediatric Dentistry)  
206-616-6880  
Hours: 6:30 a.m. to 5 p.m.  
Monday - Thursday.  
Leave a message, and we will call you back.
- After hours, call 206-987-2000 and ask for the on-call dental resident.

**Free Interpreter Services**

- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.
- For Deaf and hard of hearing callers  
206-987-2280 (TTY)

# Minor Mouth Surgery

## How to care for your child at home

**What about my child's bleeding?**

When you leave the clinic after mouth surgery, your child will be biting down on a gauze pad. The constant pressure helps the blood clot. Remove the pad after 20 minutes.

Blood may ooze all day. If there is a lot of bleeding, get a new piece of gauze wet and fold it over into a pad. Place the new pad over the wound. Have your child bite down firmly for 20 minutes. If your child keeps bleeding, please call.

**What about pain medicine?**

When you get home, give your child the pain medicine before the numbness from the local anesthetic wears off.

If your child feels sick to their stomach or vomits after taking the medicine, wait awhile before giving them anything to drink or more medicine. When your child feels better, give clear fluids such as water or flat 7-Up and then give the medicine again. If your child keeps vomiting, please call the clinic.

Give the pain medicine as directed until the wound feels better. Some pain or ache may last for a week. If it hurts more after the third day, please call.

**Is swelling bad?**

No, swelling means the wound is healing. The most swelling is 2 days after surgery. It will take 5 to 7 days to go away. If the swelling keeps increasing after the third day, please call.

**How are ice packs used?**

The amount of swelling in the first 3 days depends on the amount of surgery. Ice packs may help. Place an ice pack on the outside of your child's face. Leave it on for 15 minutes. Take it off for 15 minutes. Then, repeat this sequence for the rest of the day.

If swelling increases after three days, please call.

**What about rinsing with warm salt water?**

Salt water helps keep the wound clean and makes it feel better. Have your child rinse their mouth starting the day after surgery. Mix ½ teaspoon of salt in a large glass of warm water. Have your child swish the warm salt water in their mouth for a few seconds (10 to 15) every 2 to 3 hours for the rest of the day.

Starting the day after surgery your child can continue brushing their teeth as usual, but have them avoid touching the wound with the toothbrush.

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201.

This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider.

© 1994, 2003, 2007, 2009, 2011 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.