

Инструкции по выписке домой после стоматологической операции

Ваш ребенок прошел следующее лечение:

- Покрытие защитной пленкой одного или нескольких зубов
- Поставлена одна или несколько коронок или пломб цвета зубов
- Поставлена серебряная пломба (пломбы)
- Поставлена серебряная коронка (коронки)
- Проведено лечение нерва
- Удален зуб (зубы)

Когда мой ребенок может есть и пить?

- После операции важно пить жидкости. Давайте Вашему ребенку сок, воду или спортивные напитки несколько раз в день.
- В течение, как минимум, 24 часов давайте мягкую пищу, такую как яблочное пюре, желе, суп, лапшу, пудинг и овсяную кашу.
- К обычной пище можно возвратиться через день после операции.

Будет ли мой ребенок чувствовать боль?

- Ваш ребенок получил лекарство от боли, пока спал. Оно перестанет действовать через 2 часа.
- Для облегчения дискомфорта начните с лекарства Acetaminophen (Tylenol) или Ibuprofen (Motrin). После пломбирования часто появляется чувствительность зуба. Не давайте горячую или холодную пищу.
- Ваш врач может выписать рецепт на лекарство от боли. Попросите об этом, если чувствуете, что Ваш ребенок нуждается в лекарстве.
- Боль может продолжаться несколько дней. Позвоните, если на третий день после операции боль стала сильнее.

Чистка зубов

- Если Вашему ребенку удалили зубы, помогите ему осторожно почистить зубы, чтобы избежать повреждения затянувшейся ранки, так как это может вызвать кровотечение.
- Фтористое покрытие имеет желтый цвет, который исчезнет от чистки зубов через несколько дней.
- Чистите зубы по крайней мере дважды в день, чтобы предотвратить образование новых зубных полостей.

Как надо ухаживать за местом удаления?

Онемение:

- Если Вашему ребенку удалили зубы, то при этом была применена местная анестезия (типа Novocain). Она перестанет действовать через несколько часов.
- Следите за Вашим ребенком, чтобы он не прикусывал губы и щеки.

Отечность:

- Нет ничего необычного в том, что вы можете заметить припухлость на губах или вокруг места, откуда был удален зуб. Это должно пройти через 5-7 дней. Если отек увеличивается по истечению трех дней после операции, позвоните по соответствующему номеру, указанному в рамке слева.
- Прикладывайте лед на 20 минут и делайте паузу в течение 20 минут, чтобы помочь ограничить отечность.

Инструкции по выписке домой после стоматологической операции

У Вас есть вопросы или проблемы?

Если процедура проводилась на главном кампусе больницы Seattle Children's обращайтесь в:

- Клинику стоматологии
206-987-2243
с понедельника по пятницу с 8 утра до 5 вечера
- В Отделение неотложной помощи Seattle Children's
206-987-2222
с понедельника по пятницу с 5 вечера до 8 утра и в выходные дни

Если процедура проводилась в Центре стоматологической хирургии в Magnuson Park обращайтесь:

- В Центр стоматологической хирургии (в Центре Педиатрической стоматологии)
206-616-6880
С понедельника по четверг с 6:30 утра до 5 вечера. Оставьте сообщение и Вам перезвонят.
- В нерабочие часы звоните по телефону 206-987-2000 и попросите дежурного стоматолога.

Кровотечение:

- Можно ожидать небольшое количество крови во рту. Кровь может слабо сочиться весь день, делая слюну красноватой.
- Прижатие зубами тампона из марли создает давление и помогает остановить кровотечение.
- Если кровотечение становится проблемой, позвоните по соответствующему номеру, указанному в рамке слева.

Уход за местами удаления зубов:

- Не полощите рот и не пользуйтесь трубочками для питья в течение 24 часов.
- Если были наложены швы, они рассосутся сами.

Рвота

Нет ничего необычного в том, что после общей анестезии у ребенка появится тошнота или рвота. Если у Вашего ребенка продолжается рвота или у него возникают тревожные признаки, перечисленные ниже, позвоните по соответствующему номеру, указанному в рамке слева.

Когда следует звонить врачу?

Если у Вашего ребенка возникает любой из следующих тревожных признаков, пожалуйста, звоните нам:

- Температура выше 101.5°F в течение 24 часов или дольше
- После 3 дней отечность усиливается
- После третьего дня боль усиливается
- Нет мочеиспускания в течение 8-12 часов
- Рвота
- Другие проблемы или вопросы

Бесплатные переводческие услуги

- Извне госпиталя позвоните по бесплатной переводческой линии для семьи 1-866-583-1527. Назовите переводчику нужное Вам имя или добавочный номер.
- Глухие или плохо слышащие могут позвонить по тел: 206-987-2280 (TTY).

Seattle Children's предлагает бесплатные переводческие услуги для глухих, плохо слышащих или не говорящих по-английски пациентов, членов семей и законных представителей. По желанию, Seattle Children's сделает эту информацию доступной в других форматах. Позвоните в Центр помощи для семьи по тел. 206-987-2201.

Данный текст был проверен персоналом клиники Seattle Children's. Однако нужды Вашего ребенка индивидуальны. Перед тем, как действовать или полагаться на данную информацию, пожалуйста, переговорите с основным лечащим врачом Вашего ребенка.

© 2004, 2006, 2007, 2009, 2011 Seattle Children's, Seattle, Washington. Все права сохраняются.

3/11
PE464R



Dental Surgery

Discharge instructions for home

Your child received the following treatment:

- Sealant(s)
- Tooth-colored crown(s) or filling(s)
- Silver filling(s)
- Silver crown(s)
- Nerve treatment
- Extraction(s)

When can my child eat and drink?

- Liquids are important right after surgery. Offer your child juice, water or sports drinks several times a day.
- Give a soft diet for at least 24 hours. Applesauce, Jell-O, soup, noodles, pudding and oatmeal are good choices.
- Your child can return to a balanced diet 1 day after surgery.

Will my child have pain?

- Your child received pain medicine while asleep. It will begin to wear off in 2 hours.
- Begin with acetaminophen (Tylenol) or ibuprofen (Motrin) to relieve discomfort. It is not uncommon to have sensitive teeth after fillings are placed. Avoid hot or cold foods.
- Your doctor may provide a prescription for pain medicine. Ask for one if you feel your child needs it.
- Pain can last for a few days. Call if the pain is greater on the third day after surgery.

Brushing

- If your child had teeth removed, help your child to brush gently to avoid disturbing the clot, as this may cause bleeding.
- The fluoride varnish has a yellow color that will come off with brushing over the next few days.
- Brush at least twice a day to prevent new cavities.

How do I care for the extraction site?

Numbness:

- If your child had teeth removed, local anesthesia (like Novocain) was used. It will wear off in a few hours.
- Watch so your child avoids chewing their lips and cheeks.

Swelling:

- It is not uncommon to notice some swelling of the lips or around the area where the tooth was pulled. This should go away in 5 to 7 days. If it is increasing after the third day after surgery, call.
- Place ice packs 20 minutes on and 20 minutes off to help limit swelling.

Dental Surgery: Discharge instructions for home

Questions or problems?

If your procedure was at Seattle Children's main hospital campus:

- Dental Clinic
206-987-2243
Hours: 8 a.m. - 5 p.m.
Monday - Friday
- Children's Emergency Room
206-987-2222
Hours: 5 p.m. - 8 a.m.
Monday - Friday;
and weekends

If your procedure was at the Dental Surgery Center in Magnuson Park:

- Dental Surgery Center (at the Center for Pediatric Dentistry)
206-616-6880
Hours: 6:30 a.m. to 5 p.m.
Monday - Thursday.
Leave a message, and we will call you back.
- After hours, call 206-987-2000 and ask for the on-call dental resident.

Bleeding:

- A small amount of bleeding is expected from the mouth. Slight oozing can last all day and make the saliva look reddish.
- Biting on gauze creates pressure and will help stop the bleeding.
- If bleeding is a problem, call.

Taking care of extraction sites:

- Do not rinse mouth or use a straw for 24 hours.
- If stitches were used, they will dissolve on their own.

Vomiting

It is not uncommon for a child to have an upset stomach or to vomit after a general anesthetic. If your child continues to vomit or has any of the warning signs listed below, please call.

When should I call the doctor?

If your child has any of these warning signs, please call us:

- Fever over 101.5 F for more than 24 hours
- Swelling seems worse after 3 days
- Pain is greater after the third day
- Not able to pee in 8 to 12 hours
- Vomiting
- Other concerns

Free Interpreter Services

- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.
- For Deaf and hard of hearing callers: 206-987-2280 (TTY)

Seattle Children's offers interpreter services for Deaf, hard of hearing or non-English speaking patients, family members and legal representatives free of charge. Seattle Children's will make this information available in alternate formats upon request. Call the Family Resource Center at 206-987-2201.

This handout has been reviewed by clinical staff at Seattle Children's. However, your child's needs are unique. Before you act or rely upon this information, please talk with your child's healthcare provider.

© 2004, 2006, 2007, 2009, 2011 Seattle Children's, Seattle, Washington. All rights reserved.
