

Plan de tratamiento para infecciones de huesos y articulaciones

Su niño tiene:

- Osteomielitis:** Es una infección del hueso causada frecuentemente por la bacteria estafilococo.

El tratamiento es a base de un curso de antibióticos que puede durar de cuatro a seis semanas. Se usan antibióticos orales y por medio de infusión intravenosa – por lo general, primero se aplica el antibiótico vía infusión intravenosa y después vía oral. Algunas veces todo el curso de antibióticos es aplicado vía infusión intravenosa. El tratamiento continúa hasta que su niño tenga una disminución de fiebre, dolor, inflamación y salgan normales las pruebas de laboratorio.
- Artritis séptica:** Ésta es una infección de la articulación que puede ser causada por la bacteria estafilococo o por otra bacteria.

El tratamiento es a base de un curso de antibióticos que puede durar de tres a cuatro semanas. Se usan antibióticos orales o por medio de infusión intravenosa para tratar esta infección – por lo general primero se aplican vía infusión intravenosa y después vía oral. Algunas veces todo el curso de antibióticos es aplicado vía infusión intravenosa. El tratamiento continúa hasta que su niño tenga una disminución de fiebre, dolor, inflamación y salgan normales las pruebas de laboratorio.

Por favor siga estos pasos para que mejore su niño.

Concierte las citas clínicas

Para un tratamiento apropiado, su niño necesita ver a dos distintos especialistas aquí en el hospital Children's, un ortopedista y un médico especialista en enfermedades infecciosas.

- Llame a la clínica de ortopedia para concertar o cambiar una cita al (206) 987-2109. La primera cita será una semana después de que salga su niño del hospital. Concierte cada una de las citas de seguimiento al salir de sus citas en la clínica. Se programa una cita a la vez.
- Llame a la clínica de enfermedades infecciosas al (206) 987-2613 para concertar sus citas. La primera cita con ellos deberá hacerse para la semana siguiente a su primera cita en la clínica de ortopedia. Las demás citas en la clínica de enfermedades infecciosas deberán concertarse para cada tercer semana después de sus citas en la clínica de ortopedia. Se programa una cita a la vez y solamente los miércoles.

Administre los medicamentos

Ambas infecciones son serias y ambas se tratan con antibióticos. Es muy importante administrar los antibióticos según las instrucciones. Esto significa administrar todas las dosis a tiempo y no perder ninguna dosis. Los antibióticos intravenosos por lo general deben guardarse en el refrigerador.

Continúa

Plan de tratamiento para infecciones de huesos y articulaciones

Administre los medicamentos (continuación)

Este es el medicamento que su niño toma y el horario a seguir:

- Para el **cefazolin (Ancef, IV)**: administre cada 8 horas en horario continuo.
- Para el **cephalexin (Keflex, oral)**: administre cada 6 horas en horario continuo.
- Para el **vancomycin (IV)**: administre cada 8 a 12 horas en horario continuo.
- Para el **clindamycin (IV u oral)** administre cada 8 horas en horario continuo.
- Otros: _____

Administre los antibióticos en horario continuo según las instrucciones de arriba. Necesitará despertar a su niño durante la noche para administrar su dosis a tiempo.

Por favor traiga los frascos de las medicinas a las citas para contar la medicina y asegurarnos de que tenga suficiente.

Efectos colaterales de estos medicamentos

Estos medicamentos pueden ocasionar efectos colaterales tales como vómito, diarrea, dolor de estómago, urticaria o candidiasis bucal (algodoncillo u hongo bucal).

Los antibióticos también pueden causar que los resultados de las pruebas del hemograma salgan anormales. Debe reportar cualquiera de estos síntomas al becario (doctor) especialista en enfermedades infecciosas al (206) 987-2000.

Asegúrese de que se lleven a cabo las pruebas de laboratorio

Cada semana su niño tendrá las siguientes pruebas de laboratorio:

- Hemograma para ver los efectos colaterales de la medicina (CBC en inglés)
- Proteína reactiva-C (CRP en inglés) e índice de la sedimentación de eritrocitos (ESR en inglés) para ver la reacción al tratamiento

Asegúrese de que su niño obtenga todas las pruebas de laboratorio que se han ordenado.

Si desea saber los resultados de las pruebas de

laboratorio, llame al médico de enfermedades infecciosas o a la clínica según le haya sido recomendado.

Fíjese en los siguientes signos de alerta para llamar al doctor

Llame si su niño tiene:

- Fiebre arriba de 101° F
- Aumento de enrojecimiento o inflamación
- Aumento de dolor
- Supuración en el sitio

Llame a la enfermera de ortopedia durante la semana al (206) 987-4179 o al doctor de ortopedia residente de guardia al (206) 987-2000 después de las 5 p.m. de lunes a viernes o en fines de semana. Si para hacer cualquier llamada al hospital Children's necesita la asistencia de un intérprete, por favor marque nuestra línea gratis de interpretación telefónica al 1-866-583-1527.

Clinica de ortopedia	(206) 987-2109
Para hacer citas en la clínica de ortopedia	(206) 987-2109
Para hacer citas en la clínica de enfermedades infecciosas	(206) 987-2613
Para hablar con un médico de enfermedades infecciosas acerca de surtidos de antibióticos o efectos secundarios	(206) 987-2000
Para hablar con una enfermera de ortopedia durante horas hábiles	(206) 987-4179
Para hablar con un médico residente de ortopedia después de las 5 p.m. y fines de semana	(206) 987-2000
Para mandar los resultados de pruebas de laboratorio vía fax desde un laboratorio fuera del hospital Children's	(206) 987-3890
Para problemas con la línea intravenosa (PICC) llame a <i>Children's Home Care Services</i>	(425) 482-4000

Children's
Hospital & Regional Medical Center
www.seattlechildrens.org