

Giáo Dục Bệnh Nhân Và Gia Đình

KHOA UNG THƯ - HUYẾT HỌC

Sinh Thiết Môi

Cách chăm sóc vết chích kim

Một mẫu da nhỏ được cắt bớt bên trong môi của con quý vị. Thủ thuật này được gọi là sinh thiết. Có thể con quý vị đã được chích thuốc tê để làm tê môi trước sinh thiết.

Theo thường lệ thì bệnh nhân sẽ như thế nào sau sinh thiết?

- Môi sẽ bị sưng và tê do việc chích thuốc tê.
- Con quý vị sẽ có những mũi khâu bên trong môi dưới. Những mũi khâu này sẽ tự tan trong vòng từ 2 đến 3 ngày.
- Nhiều khi quý vị sẽ thấy nước rỉ ra gần mũi khâu trong vài tiếng đồng hồ sau sinh thiết. Trong nước rỉ này có thể chứa một lượng nhỏ máu. Điều này là bình thường. Hãy gọi cho Phòng Mạch SCCA theo số (206) 288-7600 nếu lượng nước rỉ ra làm quý vị âu lo.

Khi nào tôi nên gọi cho phòng khám?

Con quý vị có thể cảm thấy khó chịu khi thuốc tê hết tác dụng. Hãy gọi cho Phòng Khám SCCA theo số (206) 288-7600 nếu con quý vị kêu đau sau sinh thiết.

Tôi có thể cho cháu ăn gì?

- Hãy cho con quý vị ăn thức ăn nguội hoặc lạnh, như kem que (Popsicle) và các loại thức uống lạnh. Những thứ này sẽ giúp giảm sưng và dịu bớt cơn đau.
- Không cho con mình ăn thức ăn cay hoặc thức ăn giòn và giòn (như là Doritos) cho đến khi chỉ khâu đã tan hẳn.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN

- Khoa Ung Thư- Huyết Học, (206) 987-2106
- Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Y Tế Của Con Quý Vị

Bệnh Viện Nhi Đồng sẵn sàng cung cấp thông tin bằng hình thức khác tùy theo yêu cầu. Hãy gọi Phòng Thông Tin Tiếp Thị theo số (206) 987-5205.

Bản tin này đã được nhân viên phòng mạch tại Bệnh Viện Nhi Đồng kiểm tra lại. Tuy nhiên, con quý vị có thể có những nhu cầu riêng. Trước khi quý vị làm theo hoặc dựa vào thông tin này, hãy thảo luận với nhân viên chăm sóc sức khỏe của con mình..

Children's

Hospital & Regional Medical Center

www.seattlechildrens.org

Thành viên của Liên Minh Chăm Sóc Ung Thư Seattle (SCCA), một nhóm hợp tác bao gồm Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Fred Hutchinson, Đại Học Washington, và Bệnh Viện Nhi Đồng và Trung Tâm Y Tế Vùng