

Material educativo para el paciente y la familia

TRANSFUSIÓN

Instrucciones sobre la transfusión

Signos que deben observarse después de una transfusión de sangre

Su niño recibió hoy una transfusión de sangre. Aunque es raro, a veces ocurren reacciones a las transfusiones. Durante las próximas horas, observe cualquiera de los siguientes síntomas, los cuales podrían indicar que su niño está teniendo una reacción a la transfusión.

Signos de posibles problemas:

- Falta de aire o dificultad para respirar – **LLAME AL 911**
- Fiebre o escalofríos
- Sarpullido o comezón
- Dolor de espalda por debajo de las costillas
- Náusea o vómito
- Confusión o nerviosismo
- Cualquier cambio en la salud de su niño que a usted le preocupe

Precauciones en las actividades

Si su niño recibió una medicina que lo hace sentirse tambaleante o soñoliento:

- Obsérvelo por las próximas 4 a 6 horas o hasta que el efecto de la medicina haya pasado completamente. Es posible que su niño necesite asistencia para caminar.
- Supervise sus actividades para asegurarse que no se caiga, ande en bicicleta, maneje automóviles o use máquinas peligrosas, por lo menos por 12 horas.

A quién debo contactar

- (206) 987-2000** – pida que lo comuniquen con el doctor residente de turno de Hematología/Oncología
- (206) 987-2000** – pida que lo comuniquen con el doctor residente de turno de Nefrología.
- SCCA Pacientes de trasplante:
(206) 288-7600 entre las 8 a.m. hasta la medianoche.
(206) 987-2032 desde la medianoche hasta las 8 a.m.

Children's pondrá a disposición en formatos alternativos si así se solicita. Por favor llame al Centro de recursos para las familias al (206) 987-2201.

Este volante lo revisó el personal clínico del Hospital Children's. Sin embargo, las necesidades de su niño son únicas. Antes de actuar o depender de esta información, por favor consúltelo con el proveedor de atención médica de su niño.