

# Instrucciones al ser dado de alta después de recibir un sedante

Cómo cuidar a su niño después del sedante

**Nombre del paciente:***Patient's name*

---

**Procedimiento:***Procedure*

---

**Medicina usada:***Medication used*

---

---

**Teléfono:***Telephone*

---

**Clínica:***Clinic*

---

A su niño se le dió un sedante para hacerlo dormir o relajarse durante un procedimiento. Cada niño reacciona de diferente manera a los sedantes.

**Somnolencia**

- Su niño podría dormir hasta 8 horas después del procedimiento. Los niños también, pueden estar soñolientos, tambaleantes y confundidos. Esto es normal.
- Es posible que necesite cargar a su niño o darle la mano al regresar a su automóvil para evitar que se caiga. Use un asiento infantil como normalmente lo haría.

### Para más información

- Llame a la clínica de su niño
- El proveedor de atención médica de su niño
- [www.seattlechildrens.org](http://www.seattlechildrens.org)

### Servicios gratis de interpretación

- Dentro del hospital, solicítelo con la enfermera de su niño.
- Fuera del hospital, llame a nuestra línea gratis de interpretación telefónica 1-866-583-1527. Menciónele al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.
- Para personas sordas y con problemas de audición 206-987-2280 (TTY)

### Actividades que deben evitarse por 24 horas

No deje a su niño correr, escalar, andar en bicicleta, triciclo, patineta, monopatín o manejar un vehículo motorizado por 24 horas.

### Alimentos sólidos y líquidos

- Si su niño tiene menos de 18 meses de edad, puede alimentarlo como lo hace normalmente.
- Si su niño es mayor de 18 meses de edad, déle líquidos transparentes como jugo de manzana, agua, jugo de uva o paletas de hielo. Si su niño no vomita después de esto, entonces puede darle alimentos sólidos.
- Ofrézcale a su niño líquidos en abundancia durante las primeras 24 horas después del sedante. Si no logra hacer que su niño tome la cantidad de líquidos que regularmente toma, contacte al doctor de su niño.
- La medicina que usamos normalmente no causa vómito. Si su niño vomita más de una vez después del procedimiento, llame al doctor de su niño.

### Medicina

- Pregúntele al doctor de su niño cuáles son las medicinas que debe evitar por 24 horas después del procedimiento.