

Punción lumbar con Spinraza (nusinersen)

Cuidados de la piel en el lugar del procedimiento

Su niño tuvo una punción lumbar y recibió Spinraza, también llamado nusinersen. Para este procedimiento se coloca una aguja en la columna vertebral por donde se extrae líquido cefalorraquídeo y se inyecta Spinraza (nusinersen).

¿Cómo prevenir infecciones?

- Mantenga el curita limpio y seco
- Deje el vendaje hasta la hora de acostarse o hasta la mañana
- Quitando el vendaje la mañana siguiente
- No lo deje por más de 24 horas. Un vendaje sucio puede aumentar el riesgo de infección

¿Tendrá dolor mi niño?

Su hijo recibió un medicamento para entumecer el área y/o anestesia durante la punción lumbar que le ayudará a calmar el dolor cuando se despierte. La mayoría de los niños no necesitan medicinas fuertes para el dolor a menos que haya sido difícil colocar la aguja. En ese caso, le avisaremos para que sepa que su hijo puede tener molestias. Llame a su proveedor de atención médica si su hijo se queja de dolor.

¿Cómo manejo los efectos secundarios generales de una punción lumbar?

Aunque rara vez hay efectos secundarios después de una punción lumbar, lo más común es el dolor de cabeza. Para reducirlo, su hijo tendrá que estar completamente acostado por 1 hora después del procedimiento. Llame al doctor si su hijo se queja de dolor de cabeza fuerte o si se pone más irritable.

Para prevenir el dolor de cabeza debe tomar mucho líquido.

¿Cómo manejo los efectos secundarios de la Spinraza?

Hay reportes de que la Spinraza (nusinersen) causa trombocitopenia y disminución de las plaquetas. Las plaquetas son las encargadas de la coagulación de la sangre. Haremos una prueba de sangre antes de cada cita para saber cómo están sus plaquetas. Su proveedor de atención médica le explicará cómo se hace y dónde. Avísele a su proveedor de atención médica si nota que tiene más moretones, le sale sangre o le sangra la nariz. Con medicamentos como Spinraza se han reportado lesiones renales llamadas glomerulonefritis. Por eso, le haremos análisis de orina antes de cada procedimiento. Si usted nota que la orina es de color café o tiene sangre, contacte a su proveedor de atención médica.

Llame a al Servicio de Rehabilitación al 206-987-2114 si desea más información o si tiene alguna duda.

Más información

- Neurología
206-987-2078
- Hable con el proveedor de atención médica de su hijo
- seattlechildrens.org

Servicio gratuito de interpretación

- En el hospital, solicítelo a la enfermera.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de interpretación: 1-866-583-1527. Mencíonele al intérprete el nombre de la persona o extensión que necesita.



¿Cuándo debo llamar al médico?

Llame a Neurología al 206-987-2078 si nota: Call Neurology at 206-987-2078, option 4 if you notice any of these warning signs:

- Hinchazón o enrojecimiento alrededor de la piel en el sitio del procedimiento
- Fiebre de 101 F (38,3 grados Celsius)
- Si sitio de la punción tiene sangre o supura un líquido claro
- Dolor de cabeza fuerte o aumenta la irritabilidad

Lumbar Puncture with Spinraza (nusinersen)

How to take care of the skin site

Your child had a lumbar puncture (LP) or spinal tap with Spinraza, also called nusinersen. This is when a needle is placed in the spine to remove fluid and inject Spinraza (nusinersen).

How do I prevent infection?

- Keep the Band-Aid or dressing clean and dry.
 - Leave the dressing in place until bedtime or the next morning.
 - Remove the dressing the next morning.
 - Do not leave it on for more than 24 hours. A dirty dressing could increase the chance for infection.
-

Will my child have any pain?

Your child was given numbing medication and/or anesthesia during the lumbar puncture. This should help after they wake up. Most children do not require strong pain medication unless it was hard to get the needle into the spine. We will tell you if this occurred, and if you should expect your child to be uncomfortable. Let your provider know if your child complains of pain at home.

How do I manage general lumbar puncture side effects?

Side effects are rare after lumbar puncture. One common side effect is a “spinal headache.” Your child will be asked to lie flat for 1 hour after the procedure in hopes of reducing this headache. Call the clinic if your child complains of a severe headache or has increased irritability.

You can help prevent a headache at home by drinking plenty of fluids.

How do I manage Spinraza side effects?

Spinraza (nusinersen) has had reported side effects of thrombocytopenia, or low platelets. Platelets help your blood clot. Your child will need to go to the lab for a blood test before each visit to check for this possible side effect. Your child’s provider will discuss details about the lab process and location with you. Contact your provider if you notice an increase in bruising, bleeding, or if your child develops nose bleeds. With medications like Spinraza, there is a report of kidney injury called glomerulonephritis. Your child will have urine tests before every procedure to check for this; however, contact your provider if you notice brown or cola-colored urine.

Call Neurology at 206-987-2078 for information or concerns.

To Learn More

- Neurology
206-987-2078
- Ask your child’s healthcare provider
- seattlechildrens.org

Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.

When should I call the clinic?

Call Neurology at 206-987-2078, option 4 if you notice any of these warning signs:

- Swelling or redness around the skin site
- Fever of 101 degrees Fahrenheit (38.3 Celsius)
- Blood or clear fluid draining from the skin site
- Severe headache or increased irritability