

# Cuidados después de una cirugía multinivel

Una cirugía de múltiples niveles (SEMLS, sus siglas en inglés) puede afectar la vida de la familia por varios meses. Este folleto habla de los cuidados necesarios después de la cirugía.

## ¿Cuáles son las diferentes etapas de la recuperación?

La terapia física es parte importante de la recuperación después de una cirugía multinivel. Este es un resumen de las posibles etapas de rehabilitación que tendrá que seguir.

- **Paciente internado en etapa aguda:** después de la cirugía, su niño estará internado en el hospital para asegurarnos de que controlamos el dolor y que pueda trasladarse de un lugar a otro de manera segura. Puede necesitar ayuda para pasarse de la cama a una silla de ruedas o a las muletas. En el baño, tendrá que pasarse a la silla de ruedas o de las muletas al inodoro. La cantidad de días internado depende del tipo de procedimiento y de la recuperación.
- **Primera parte del postoperatorio:** después de salir del hospital, el cirujano y el grupo médico le explicará las restricciones para actividades. En esta parte de la recuperación, usted y su niño trabajarán en la amplitud de movimiento y control del dolor antes de comenzar la rehabilitación intensiva.
- **Rehabilitación intensiva:** por lo general, comienza 6 semanas después de la cirugía. La terapia intensiva de rehabilitación de su niño puede incluir terapia física y ocupacional dependiendo de sus necesidades. La terapia se hace hasta 3 veces por semana, ya sea en la Unidad de Rehabilitación o como paciente ambulatorio.
  - Generalmente, la rehabilitación como paciente interno es de 1 a 2 semanas. La duración la determina el grupo médico de Rehabilitación. Su niño recibirá terapia como paciente ambulatorio después del alta del hospital.
  - La terapia más intensa para pacientes ambulatorios es por lo general de 3 meses.
- **Última parte del posoperatorio:** al final de la terapia física intensiva, continuará con ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Por lo general, la terapia física es de menor frecuencia que la fase intensiva de la rehabilitación y es para que su niño aproveche al máximo la cirugía.

## Control del dolor

Después de un procedimiento SEMLS su niño recibirá medicamentos para el dolor. Más abajo, una lista de los tipos de dolor que puede tener después de la cirugía y los medicamentos que podemos recomendar para manejar el dolor de su hijo.

### Más información

- Ortopedia  
206-987-2109
- Consulte con el proveedor de atención médica de su hijo
- [seattlechildrens.org](http://seattlechildrens.org)

### Servicio gratuito de interpretación

- En el hospital, solicítelo a la enfermera.
- Fuera del hospital, llame a la línea gratuita de Interpretación: 1-866-583-1527. Dígale al intérprete el nombre de la persona o la extensión que necesita.

### ¿Qué tipo de dolor puede tener mi hijo?

- **Dolor agudo:** este tipo de dolor es causado por una lesión o una cirugía. Es de corta duración y se alivia una vez que se recupera. Si la cirugía fue en un hueso, es posible que el dolor agudo dure de 2 a 3 semanas. Si la cirugía fue liberación de tejidos blandos, es normal que tenga dolor agudo aproximadamente por una semana. Utilizamos oxycodone, Tylenol y Motrin para aliviar el dolor agudo. Cada uno de estos medicamentos funciona de manera distinta. Oxycodone y Motrin se deben tomar con comida para evitar problemas gastrointestinales.
- **Neuralgia (dolor en los nervios):** la neuralgia es causada por la irritación de los nervios durante la cirugía. Cuando los nervios musculares se estiran y cambian de posición puede causar dolor. Mientras su niño está en el hospital, lo cambiaremos de posición para evitar estiramientos de nervios y reducir malestares. Cambiándolo de posición con frecuencia puede sentirse más cómodo y proteger más la piel. El dolor por estiramiento de los nervios puede aparecer como ardor, punzadas, hormigueo o entumecimiento. Usamos gabapentin o Lyrica para este tipo de dolor, pero pueden demorar hasta un mes en alcanzar su máximo efecto. Si su niño tiene dolor en los nervios, empezaremos con una dosis baja que se puede aumentar cuando sea necesario. Generalmente, este medicamento se debe tomar 3 veces al día para obtener el mayor efecto.
- **Espasmos musculares:** algunos niños pueden tener espasmos musculares después de la cirugía. Los músculos irritados pueden ser muy dolorosos. A veces se puede ver que el músculo tiembla o que su niño se queja repentinamente. Cambiar de posición puede ayudar, pero también podemos darle diazepam o lorazepam.

Use estos medicamentos solo si lo recomienda el proveedor de atención médica de su hijo. Consulte siempre con su proveedor de atención médica antes de darle cualquier tipo de medicina a su niño.

---

### ¿Cuándo debo llamar al doctor?

Es importante inspeccionar la piel de su hijo con frecuencia mientras esté usando una férula o un yeso.

Llámenos si su hijo tiene:

- Fiebre de 101.6 grados F (38.6 grados C) o más
- Dolor que empeora aún después de darle analgésicos de acuerdo con las indicaciones
- Los dedos de los pies están más pálidos que el tono de piel normal
- Cambio de color en la piel o irritación que se extiende por la pierna
- Un sangrado nuevo
- Vomita más de 2 veces o vomita todo lo que toma

Durante horas de oficina, llame a Ortopedia al 206-987-2109. A la noche y fin de semana, llame al operador de Seattle Children's al 206-987-2000. Pida hablar con el médico de Ortopedia de guardia.

# Care After Multi-Level Surgery (SEMLS)

---

Single event multilevel surgeries (SEMLS) can affect the lives of families for months after the surgery. This handout reviews the care needed after surgery.

---

## What are the stages of recovery?

Physical therapy is an important part of recovery after a single event multilevel surgery (SEMLS). Here is an overview of the stages of rehabilitation you might expect.

- **Acute inpatient:** Your child will stay at the hospital after surgery to make sure their pain is under control and they can be transferred from one spot to another safely. They may need help transferring from their bed to their wheelchair/crutches or from their wheelchair/crutches to the toilet. The number of days in the hospital depends on your child's procedure and recovery.
- **Early post-operative:** After leaving the hospital, your child may have activity restrictions that are determined by the surgeon and your child's care team. During this time, you and your child will work on range of motion and pain control in order to get ready to start intensive rehabilitation.
- **Intensive rehabilitation:** This typically starts 6 weeks after surgery. Your child will begin intensive therapy, which can include physical and occupational therapy depending on your child's needs. This can happen in the inpatient rehabilitation unit or outpatient with therapy up to 3 times per week.
  - An inpatient rehabilitation stay is typically 1 to 2 weeks. The duration is determined by the rehabilitation team. Your child will have outpatient therapy following their stay in the hospital.
  - The higher frequency of outpatient therapy is typically for 3 months.
- **Late post-operative:** After your child completes the intensive physical therapy, they will need to continue with stretching and strengthening. Physical therapy is typically continued less often than during the intensive rehabilitation phase. This is to make sure your child gets the most benefit from surgery.

---

## Pain control

Following a SEMLS procedure, your child will be on medication to help relieve pain. The next is a review of the types of pain your child may have after surgery and the pain medications we may recommend to deal with this pain.

---

### To Learn More

- Orthopedics  
206-987-2109
- Ask your child's healthcare provider
- [seattlechildrens.org](http://seattlechildrens.org)

### Free Interpreter Services

- In the hospital, ask your nurse.
- From outside the hospital, call the toll-free Family Interpreting Line, 1-866-583-1527. Tell the interpreter the name or extension you need.

### What types of pain will my child have?

- **Acute pain:** This type of pain is caused by an injury or surgery. It is short-term and will stop once your child has healed from their injury or surgery. If your child had bone surgery, we expect them to have acute pain for about 2 to 3 weeks. If your child had soft tissue releases, we expect them to have acute pain for about one week. We use oxycodone, Tylenol and Motrin to help relieve acute pain. Each medication works on pain in different ways in the body. Oxycodone and Motrin should be given with food to avoid gastrointestinal symptoms.
- **Nerve pain:** Nerve pain is caused by irritation of the nerves during surgery. The nerves can be stretched during surgery after the muscles are lengthened. The nerve is now in a new position, and this can cause pain. While your child is in the hospital, we will focus on positioning to help prevent nerve stretch and reduce discomfort. Changing your child's position frequently (called "positioning") can help them stay comfortable and keep their skin healthy. The pain felt from nerve stretch can feel like burning, stabbing, tingling or numbness. We use gabapentin or Lyrica for this type of pain. Gabapentin and Lyrica can take up to one month to reach their full effect. If your child is having nerve pain, we will start at a low dose which can be increased as needed. Typically, this medication needs to be taken three times per day to get the most benefit.
- **Muscle spasms:** Some kids will have muscle spasms after surgery. The spasms happen because the muscle becomes irritated after surgery. The spasms can be painful. Sometimes you can see the muscle twitching, or your child may complain of a sudden start of pain. Sometimes changing body position can help. We use diazepam or lorazepam to help with the muscle spasms.

Use these medicines only if recommend by your healthcare provider. Check with your healthcare provider first before giving any type of medicine to your child.

---

### When should I call the doctor?

It is important to regularly check your child's skin while they are wearing braces or casts.

Please call if your child has any of these warning signs:

- Fever of 101.6 degrees F (38.6 degrees C) or higher
- Pain that gets worse even after giving pain medicines according to direction and on time
- Toes that are a lighter shade from normal skin tone
- Skin color change or irritation spreading up the leg
- New bleeding
- Throwing up more than twice and being unable to keep liquids down

During weekday business hours, call the Orthopedics Clinic at 206-987-2109. On evenings and weekends, call the operator at Seattle Children's at 206-987-2000. Ask the operator to page the orthopedic resident on call